

會考趨勢 簡單C → 基礎B → 精熟A

依照心測中心所公布試題通過率，並按試題難易度與通過率分成**簡單C**、**基礎B**和**精熟A**三種等級，幫助學生輕鬆了解會考的布題與趨勢。在解題過程中，特別標示破題關鍵，使考生能迅速掌握得分之鑰。

簡單C	通過率65%以上
基礎B	通過率41~64%
精熟A	通過率40%以下




簡單C

能部分知道及理解名詞定義、學習內容或定理的常見應用。

111會考〔8〕 | 77% | 巨觀與微觀 | 第一冊 → 雙向生物P239

- (B) 1. 將月球、太陽、氫原子、口腔皮膜細胞依照體積大小，標示於右圖中的體積尺度示意圖。圖中越靠近數線左端的物質，體積越小；越靠近數線右端的物質，體積越大。則下列四項甲、乙、丙、丁的對應方式，何者最合理？



破題關鍵

巨觀：肉眼可見或更大的事物，例如月球、101大樓。**微觀**：人類肉眼不可見的微小事物，例如白血球、水分子、氧原子。

解析 體積由小至大順序為：氫原子 < 口腔皮膜細胞（細胞） < 月球（衛星） < 太陽（恆星），對照圖形，甲——氫原子，乙——口腔皮膜細胞，丙——月球，丁——太陽，故選(B)。

111會考〔11〕 | 73% | 人類的血型 | 第二冊 → 雙向生物P166

- (C) 2. 人類的ABO血型是由一對遺傳因子控制，而控制此血型的遺傳因子有 I^A 、 I^B 和 i 三種型式，其中 I^A 和 I^B 是顯性， i 是隱性，血型和基因型的關係如表(一)所示。表(二)為甲~丁四組父母的血型配對，在不考慮突變的情況下，則表(二)中的何種組別不可能生下O型血型的子女？

表(一)

血型	基因型
A	$I^A I^A$ 或 $I^A i$
B	$I^B I^B$ 或 $I^B i$
AB	$I^A I^B$
O	ii

表(二)

組別	雙親	父	母
甲		A	A
乙		A	B
丙		O	AB
丁		O	O

破題關鍵

依照O型的基因型為 ii ，父母雙親必須各提供一個 i 遺傳因子才有機會生出O型的子女。

- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

解析 從表(二)可以看出丙的母親為AB型，基因型為 $I^A I^B$ ，不具有 i 遺傳因子，故無法生出O型血型的子女，選(C)。




基礎 **B**

能知道及理解學習的內容、名詞定義、內容，藉由圖表、報告中的資料情境傳來的訊息，判讀、瞭解資料，作出合理的推論，並能運用所培養的能力來解決基本的問題。

112會考〔24〕 | 55% | 醣類的測定 | 第一冊→雙向生物P33、48



(D) 1. 右圖為物質進出膜的實驗裝置，先在試管中裝入葡萄糖液，並將試管口用一層膜密封，再倒置於裝有澱粉液的燒杯中。已知葡萄糖能通過此膜，但澱粉不能通過此膜，若靜置一段時間平衡後，分別取出溶液以試劑進行檢測，則出現下列何現象最合理？



- (A) 以碘液檢測，僅試管中的溶液變色
- (B) 以碘液檢測，試管和燒杯中的溶液皆變色
- (C) 以本氏液檢測，僅試管中的溶液變色
- (D) 以本氏液檢測，試管和燒杯中的溶液皆變色

破題關鍵


- (1) 葡萄糖能通過此膜，但澱粉不能通過此膜。
- (2)



解析 碘液檢測 **澱粉** 會變色，本氏液檢測 **糖分** 會變色。澱粉無法進入試管，故碘液檢測試管內溶液不變色，燒杯內溶液會變色；葡萄糖可藉由濃度差進出膜，故本氏液檢測試管和燒杯中的溶液皆會變色。故選(D)。

111會考〔23〕 | 58% | 能量的流動 | 第二冊→雙向生物P215


(D) 2. 下面左圖為某地的一條食物鏈，下面右圖則為依據此食物鏈各層級生物體總能量所繪製成的能量塔示意圖（面積不代表實際能量大小），若其中蛇類族群的總能量約為10,000 能量單位，則乙階層所含的總能量最接近下列何者？



- (A) 100 能量單位
- (B) 1,000 能量單位
- (C) 10,000 能量單位
- (D) 100,000 能量單位

解析 依照左圖及右圖得以確認甲為生產者植物(稻)，乙為老鼠，丙為蛇，丁為老鷹，蛇的族群總能量為 10,000 能量單位，依照每一階層大約只有 10 % 的能量繼續傳遞，其餘90%變成熱能散失， $10,000 \div 10\% =$ 100,000，故選(D)。

破題關鍵





能融會貫通學習內容，統整習得的知識原理，推論出題目圖形或資料所代表的意義，依資料推測其屬性與因果關係，並能運用探究能力解決需要多層次思考的問題。


111會考〔26〕 | 39% | 人體的血液循環 | 第一冊→雙向生物P73

(D) 1. 右表為某人體心臟內甲、乙兩個心室的血液中 O₂ 含量，根據此表，推測此兩心室所連接的血管，下列敘述何者最合理？

- (A) 甲與大靜脈連接
- (B) 甲與肺靜脈連接
- (C) 乙與主動脈連接
- (D) 乙與肺動脈連接

心室代號	O ₂ 含量 (mL/100mL)
甲	19.8
乙	15.2


破題關鍵



解析 從表中可以看出甲的 含氧量 高於乙，可以判斷甲為左心室（充氧血），而乙為右心室（缺氧血）。左心室與 主動脈 連接，右心室則與 肺動脈 連接。

111會考補考〔30〕 | 第二冊→雙向生物P138、141、164

(C) 2. 採收韭菜時，若從葉的底部割斷後，再以遮光罩將留下的根莖部遮蓋，使植株不易行光合作用，則長出的葉片會是質地軟嫩的黃色葉子，稱為韭黃，如下圖所示。根據上述，下列推論何者最合理？



- (A) 韭黃細胞是由韭菜細胞經減數分裂而來
- (B) 韭菜葉片細胞經由突變而產生黃色葉子
- (C) 韭黃與韭菜葉片細胞內的染色體數相同
- (D) 韭黃與韭菜調控葉片顏色的基因不相同

破題關鍵


項目	無性生殖	有性生殖
分裂方式	細胞分裂	減數分裂、細胞分裂
遺傳特性	子代與親代性狀完全相同	子代與親代性狀不完全相同

解析 (A)韭黃細胞是由韭菜細胞經 細胞 分裂而來；(B)因為遮光罩使韭菜 葉綠體 不容易形成，故呈現黃色葉子，並無突變的過程；(C)(D)韭黃細胞由韭菜細胞經細胞分裂而來，故染色體數目及調控葉片顏色的基因是 相 同的，故選(C)。

題組

請閱讀下列敘述後，回答下列 1.~2. 題：

老師在介紹維管束植物體內的運輸構造時，繪製了某植物莖的切面示意圖，如下左圖所示，並以甲、乙、丙及丁分別標示不同的構造。老師接著請 4 位同學上臺，各自寫出醣類與水在植物體內主要的運輸位置與方向，學生的作答結果如下表所示。



同學 \ 構造	甲	乙	丙	丁
同學 1	醣類 ↓		水 ↑	
同學 2			醣類 ↓	水 ↑
同學 3		水 ↑	水 ↑	醣類 ↓
同學 4			水 ↑	醣類 ↓ ↑

111會考〔45〕 | 63% | 植物界 | 第二冊 → 雙向生物P194

- (D) 1. 根據上圖，推論此植物屬於下列何者？
(A) 藻類 (B) 蘚苔植物 (C) 單子葉植物 (D) 雙子葉植物

破題關鍵

單子葉植物與雙子葉植物的比較：

種類 \ 特徵	子葉數目	根的形式	莖內維管束排列	葉脈	花瓣數目
單子葉植物	1 枚	鬚根	散生排列	大多是平行脈	大多是 3 的倍數
雙子葉植物	2 枚	軸根	環狀排列	大多是網狀脈	大多是 4、5 的倍數

解析 題目圖呈現莖的切面示意圖，可以看出維管束呈 環狀 排列，故選雙子葉植物(D)。

111會考〔46〕 | 62% | 植物體內的運輸構造 | 第一冊 → 雙向生物P66

- (D) 2. 根據本文，推論哪一位同學的作答結果正確？
(A) 同學 1 (B) 同學 2 (C) 同學 3 (D) 同學 4

破題關鍵

維管束的構造與功用：

項目 \ 構造	木質部	韌皮部
莖	有（內側）	有（外側）
功能	運輸水分、礦物質或農夫所施的肥料	運輸光合作用所製造的養分
運輸方向	↑（單向運輸）蒸散作用為主要的運輸動力	↑ ↓ 可雙向運輸

解析 甲為表皮，乙為形成層，丙為木質部，丁為韌皮部。水分及礦物質由 木質 部進行單向（由下至上）運輸；有機養分（醣類）由 韌皮 部進行雙向運輸（可向上及向下），故選同學4。